

そよかせたより

2009
7月号

そよかぜ歯科医院のURL
<http://soyokaze-dc.com/>



歯周病を調べるには?

プローブという器具を使って、歯周ポケットの深さや出血の有無で進行程度を調べます。炎症の有無や歯石の位置の確認などの情報も得ることができます。

今月に入り、とても暑くなり夜でも寝苦しくなりましたね。みなさん、この暑さで体調など崩されないでしようか?さて、スタッフの入れ替えにより、来月から担当の衛生士が一部変更になります。

スタッフ一同、より良い診療を目指し頑張っていきたいと思いますのでこれからもよろしくお願ひ致します。



口臭予防・舌のケアに!
フレスバランス

舌に付く汚れ(舌苔)は口臭
の原因!舌ブラシでの舌磨き
に加えて、フレスバランスでの
ケアがおすすめ!

生活リズムに合わせて選べる

3種類。爽やかなミントフレーバー☆

手軽にふくふく!リンスタイル

¥2,800

どこでもシャッピ!スプレー

¥1,300

舌からしっかり!ペースタ

¥1,000





次回は、歯周病の治療は実際どのように行っていくのかをお話したいと思います。

歯周病治療の目的

- ・歯周病の原因因子を除去し、進行を止める。
- ・ぐらついた歯を噛めるようになりますなど、口腔内の状態を回復させる。
- ・歯周病から回復した口腔内を維持させる。

診査から得られた情報をもとに、患者様にあった治療計画を立て、歯周病治療を行っていきます。



院長より

今回の歯周ポケットの測定は、歯周病の評価において現在のところ最も有用な測定方法です。歯周病が悪化すると、この値が大きくなります。すなわち歯を支える骨(顎骨)がなくなっていることがわかります。そのほかに歯が割れている場合なども歯周ポケットの値は大きくなります。そのようなケースは稀です。そのため、歯周病と歯周ポケットの値は密接な関係にあります。上記にも示されていますが、6ミリメートルより深い歯周ポケットが存在している場合は、重度歯周炎とされます。一概には言えませんが、この頃から歯の横揺れ(動搖)が出現します。この症状が現れると簡単な歯石の除去だけでは、症状が消失しません。このような場合には歯の外科的処置で悪い部分を除去するだけでなく、骨を創るような処置、あるいは抜歯が適応となります。重度歯周炎にならないためにも、検診での歯周ポケットの値を気にしてみて下さい。「3・2・3」(正常範囲)「4・4・6」(歯周病が疑われる)という測定値が聞こえると思います。

今月のスタッフ紹介

アシスタント 小林 典子

はじめまして。

5月からこちらでお世話をしています
小林です。
院長先生をはじめ、スタッフのあたたかい
ご指導の中、頑張っています。

明るく、患者様に不安を与えないよ
うに心かけたいと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。

